

「黄化えそ病」予防のため**除草**をしましょう

1. 雑草はこんなに危険です

アザミウマと**黄化えそ病**の隠れ家です。

2. 特にこんな雑草が要注意！！

(アザミウマの隠れ家や黄化えそウイルスに感染しやすい雑草)



ホトケノザ

オランダミナグサ

オオイヌノフグリ



ハキダメギク

アメリカイボアザミ

ハコベ

3. トマトやミニトマトにこんな症状が出たら要注意！！

(黄化えそ病の症状：左から頂芽のえそ(芯止まり)、葉のえそ、輪紋症状)



4. 疑わしい株を見つけたら？

疑わしい株を見つけたら、JAおおいた竹田事業部 (TEL: 63-1224) または、豊肥振興局 (TEL: 63-3177) まで御連絡ください。

トマト・ミニトマト生産者の皆様へ

－「アザミウマ」と「黄化えそ病」の予防対策－

平成25年4月1日(月)

豊肥振興局・JAおおいた竹田事業部・竹田市役所

黄化えそ病は、アザミウマがうつす病気であり、
トマトやミニトマトの栽培初期に感染すると、芯止まりの原因
にもなりますので、6月末までに以下の取組みをお願いします。

①除草が一番の予防対策です。

- ・ハウス周辺3mに雑草が無いようにしてください。
- ・特に、側面ビニール際やのり面に雑草を残すとアザミウマがハウス内に侵入しやすいです。
- ・ハウスサイドを開ける直前に除草を行うと、雑草から追い出されたアザミウマがトマトやミニトマトに一斉に移動するため、かえって逆効果です。

②定期的な薬剤散布により、アザミウマ類の防除を徹底

薬剤	倍率	マルハナバチ影響日数	
【トマト】			
◎スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	3日	} 同じ種類の農薬
ディアナSC	2,500倍	1日	
アフーム乳剤	2,000倍	2日	
カスケード乳剤	2,000倍	2日	
【ミニトマト】			
◎スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	3日	} 同じ種類の農薬
ディアナSC	2,500倍	1日	
アフーム乳剤	2,000倍	2日	
カスケード乳剤	2,000倍	2日	

※農薬使用時には必ず農薬のラベルの内容を確認し適正に使用してください。

※スピノエースとディアナは同じ種類の農薬のため、続けて散布をしないで下さい（両方同時に効かなくなります）。

万一、黄化えそ病が発生した場合、速やかに株を抜取り、圃場外に持ち出し、野外に放置せず、土に埋める、焼却する、袋に入れ密封する等により処分してください。